
PICUDO ROJO

El picudo rojo es una plaga recientemente introducida en Canarias que puede dar lugar a la destrucción de la totalidad de los palmerales del archipiélago, debido a su difícil detección, elevado potencial biológico y no emitir ningún método eficiente de control.



Dada la gravedad del problema LOS VERDES pedimos la colaboración ciudadana para localizar los posibles focos y exigir a las autoridades competentes una actuación contundente e inmediata.

¿CÓMO IDENTIFICAR UNA PALMERA ATACADA?

El síntoma inicial más evidente que presentan las palmeras atacadas es el aspecto ligeramente «decaído» de las hojas tiernas del cogollo, que posteriormente amarillean y se marchitan. En pocas semanas, la práctica totalidad de la corona se ve afectada originando la muerte de la palmera.



También tenemos que fijarnos si las hojas más

externas están retorcidas sobre el nervio central y se ponen de color pajizo o caen. En las axilas de las hojas claramente afectadas pueden apreciarse las galerías producidas por las larvas del insecto y en casos extremos llegan a verse los orificios de salida sobre el fuste del ejemplar atacado.



Los daños causados por las larvas son visibles muy tarde, y cuando los primeros síntomas de infestación aparecen, son tan graves que resultan generalmente en la muerte de la palmera.

La mayoría de las palmeras atacadas, si no reciben tratamientos inmediatos y continuos, mueren al cabo de pocos meses aunque, aparentemente, aún mantengan las hojas externas de color verde mate muy diferente al de los ejemplares sanos.

¿CÓMO IDENTIFICAR AL PICUDO ROJO?

Se trata de un gorgojo muy vistoso, de 2 a 5 centímetros de largo, con rostro alargado en forma de pico curvado, de color marrón oxidado.



Las larvas no tienen patas y son de color amarillo marfil con la cabeza rojiza (5 centímetros en su máximo crecimiento) provista de poderosas mandíbulas.

Las hembras hacen las puesta en la corona de las palmeras. De los huevos salen las larvas, las cuales viven de 2 a 4 meses y pupa



realizado con fibras entrelazadas. Los adultos salen de ahí y siguen alimentándose del interior de la palmera.


¿QUÉ HACER SI SOSPECHAMOS DE LA PRESENCIA DE LA PLAGA?

Si se encuentra en un jardín municipal: Avise inmediatamente al ayuntamiento de su localidad. Si se encuentra en espacios rurales o fincas agrícolas: Avise al cabildo insular de su isla.

En cualquier caso puede llamar a Los Verdes que haremos las gestiones oportunas.

Los Verdes: 670524171

En Canarias estamos en...



SOS: PALMERAS EN PELIGRO



Tu Oficina Verde está en...

Avenida Mesa y López, 83 (local 33)
Antiguo Edificio Cooperativa Taxistas
35010 LAS PALMAS DE G. C.
Tfno. coordinadora: 606 848277
oficinaverde@canarias.org
WWW.ECOBOLETIN.COM

